

Nach der Behandlung

Für den Patienten zu beachten:

- Bei Schmerzempfinden oder Druckgefühl sofort melden
- Bei Farbveränderung unter der Nagelplatte sofort melden
- Selber nicht schneiden, feilen oder versuchen unter der Teil-Nagel-Prothetik zu reinigen (z.B. Fussel entfernen)
- Sollte sich die Teil-Nagel-Prothetik lösen, sofort ein Pflaster anbringen und sich melden
- Schuhe und Zehenbox muss gross genug sein
- Vor längerem Abwärtsgehen die Schuhe nochmals nachbinden

Therapie:


Die Teil-Nagel-Prothetik wächst mit dem Nagel nach vorne. Sie kann bei dem Übergang wenn nötig durch die Podologin dünner geschliffen werden.

Die Teil-Nagel-Prothetik wird nach 1- 6 Monaten fachmännisch durch die Podologin entfernt.

Man kann die Therapie beliebig oft wiederholen.



Teil-Nagel-Prothetik Informationsbroschüre



Gioia-Podologie Simione | Loren-Allee 22 | 8610 Uster

044 515 47 87 | c/o Allergie + Haut 2 | www.gioia-podologie.ch

Was ist eine Teil-Nagel-Prothetik & wie wende ich sie an?

Mit der Teil-Nagel-Prothetik kann ein Nagel repariert werden. Wenn Sie durch eine Verletzung den Nagel (oder einen Teil davon) verloren haben oder wenn der Nagel falsch geschnitten wurde und dadurch einwächst, dann ist dies die richtige Therapieform.

Eine Teil-Nagel-Prothetik schützt das Nagelbett und hält es in seiner Form, bis der eigene Nagel wieder nachgewachsen ist.

Mit einem durch UV-Strahlung härtendem Gel modelliert man den fehlenden Nagelteil nach.

Neben dem medizinischen Aspekt hat man auch einen kosmetischen Nutzen.

Indikationen und Kontraindikationen für eine Teil-Nagel-Prothetik:

Wann wird es angewendet (Indikationen):

- Nagelablösung (Onycholyse) in Folge chemischer Einflüsse
- Nagelpilz (Onychomykose)
- Gespaltener Nagel (Onychoschisis)
- Holznagel (Onychauxis)
- Krallennagel (Onychokryptose)
- Hühnerauge unter dem Nagel (Subunguale Clavi)
- Rollnagel
- Traumanagel
- OP Nagel
- Falsch geschnittene Nägel

Vorsicht geboten:

- Psoriasis

Wann sollte es nicht angewendet werden (Kontraindikationen):

- Nagelablösung (Onycholyse) in Folge septischer Infektion
- Umlauf (Panaritien)
- Allergie auf Nagelprothetik Material
- Warzen (Viruelle subunguale Verrucae)
- Melanome im Nagelbereich
- Fussbad / Nagel Öl vor TNP Applikation



vor der Behandlung

Nach eigenem Ermessen:

- Sportarten mit Stopp & Go Bewegungen
- Schwimmsport
- Spitze, enge Schuhe
- Geschlossene Kompressionsstrümpfe



nach der Behandlung

Vor dem Termin für die Teil-Nagel-Prothetik

Es ist wichtig, dass 24 Stunden vor der Behandlung keine Öle oder Salben angewendet werden. Ebenfalls sollten keine Fussbäder durchgeführt werden.